## 庫全書

子部

子部 證治準鄉卷二十一

編修臣倉聖脈覆勘 群校下太醫院思提 表天錫

腾绿凰生百李 神校對官中書臣宋枋遠總校官進士臣朱 鈴 總校官進士百朱 腾録監生百季

死足四華 台書 一氣天香散 證治準繩卷 氣 看骨十 治九氧 医治草绳 蘇兼 王肯堂 乾薑 撰

四 沉香降氣散的 淡薑湯下亦得 促短氣又治脾胃留飲意醋吞酸脇下坊悶 右為極細未每服二錢八鹽少許沸湯調服不拘時 右為細未每服一錢七鹽湯調服 も 沉香 六兩二 分 八分縮砂仁七處甘草 治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎狀 治陰陽壅滞氣不升降胸膈痞塞喘 五分香附子 鹽

**贬定四車全書** 君子湯夢 中益氣湯並見十全大補湯見虚清暑益氣湯見傷 丁沉透膈湯見及木香調氣散見中補中益氣湯 治之 水一熊生薑七片紅棗二枚煎至八分不拘時服 所為也中院痞潘氣不舒快或痰飲嘔逆惡心並皆 破絮或如梅核在咽喉之間咯不出憋不下此七情 半夏湯池五次茯苓姜二分紫蘇葉六厚朴薑製 势 四物湯则鼻見虚四物湯見鼻 1 證治準絕 調

七氣湯和 拾迷七氣湯 者 攻衝作疼 右吹咀每服三錢水一盏薑三片煎至八分食遠服 藿香 香附子為青皮去陳皮去桔梗 参盖内桂去甘草人西半夏馬克七次 益智仁 半夏为洗甘草 人義 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滞 卷二 逢术 炙各 官桂

次足司更上上与 三因七氣湯見灌 流氣飲子 結不散走注疼痛脚氣腫痛並皆治之 盛面目将四肢腫大便松溫小便不通憂思大過鬱 悶咽塞 不通腹脇膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽 水二鐘生薑三片紅粟二枚煎一 桔梗 蘇兼 半夏洗川芎 治男子婦人五藏不和三焦氣壅心胸痞 青皮去當歸 證治準絕 黄耆 芍藥 枳實麸炒各 鍾食遠服 烏樂 赅

大七氣湯見 蘇子降氣湯 食がなるる 服 水 延壅盛胸膈噎塞并人年肺氣至效 紫蘇子 麩 蘆 去 鍾生 三片红東一枚煎至! 錢 炒 陳皮山甘草文木香 各 積 炒半夏二錢半 劑和 治虚陽上攻氣不升降上盛下虚處 前 檳 胡蘆去 榔 甘草多厚朴 鍾去浑不拘時 大腹子連 枳殼

アコンショー ハナラ 秘傳降氣湯 狻 喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澀裏急 脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽關格遂使 桂五分黄芪一錢 氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸隔不快咽 重臍腹冷疼若治以凉則脾氣怯弱腸鳴下利 | 鍾生薑三片煎至一錢鐘不拘時服虚冷人加 陳皮去白各 治男子婦人上熱下虚飲食過度致傷 川當歸 提治準絕 錢去 半蘆 沉香

好好四月全書 疼亦效 以温則上焦壅熱口古生瘡及脚氣上攻與火痢不 蹇宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳聾泛熱咽 右到散和句以碗盛飯節上熬一伏時傾出攤令冷 草 桑白皮二雨枳殼 便炒草果去皮膜净訶子地取半夏生薑自然少各五加皮田炒黄骨碎補鄉去毛地骨皮炒白皮炒 机股斯麸炒柴胡煮洗陳皮色甘口皮二两 机股荡浸去柴胡去毛東皮炒黄日

四磨湯 を己の日 とき 炮 **収之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水** 右四味各濃磨水取七分煎三五沸放温空心服或 茯苓每一上膈熱加北黄谷或下部大段虚加少許 分食後通口服痰效加半夏麵心肺虚每料加人 下養正丹尤佳 附子煎如使附子多加生薑婦人血虚加當歸 檳 治七情傷感上氣喘息好悶不食 榔 沉香 證治準絕 天台烏樂 一盏同煎 £

養正丹和 金好以图 台雪 急攪成汁和幻如有該以醋酒之候冷取出研極 血海火冷 贏及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人 攪次下 硃砂攪全不見星子放 下少時方下硫黄末 賣糯米糊九菜豆大每三十九鹽湯 裹湯任下 右用黑蓋一隻火上熔黑鉛成汁次下水銀以柳條 小銀 黑錫去率爭科與硫黄研味砂研細各 治上盛下虚氣不升降元陽虧損氣短身 細

火足可車 在馬 養氣丹 盛滴盡水候乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固 灰盖之火盡再煅如此三次埋地坑內 濟陰竟以硬炭五十斤分作五處煅此五石末以紙 或喘或促一切體弱氣虚之人婦人血海冷憊諸證 禹餘糧 上五石各以水再研起其清者置之紙上用竹篩 赤石脂 一次磁石 火 次半斤為末代赭石一斤 紫石英大椒 治諸百損真陽不固上實下虚氣不升降 推治準绳 次各半斤 + 两 日出火毒 六

金グリル 再 砂 志 沉 杳 附 研細入後藥 香 火不見肉 子 前樂同 過长或 子两炮二、 ノババル 陽起 各用當煅 令歸 或 山藥 桂 內旋蓉 人煮蒸 研 石 膨熟或研 極 匀用 作飽 黄 當歸 别 肉豆蔻 五靈脂 鍾乳粉 末傷 焙酒 宿酒 焙浸 胃 一浸 糯米糊九每一两作五 两一半宿 **煨麵** 赴 此主 白茯苓 **藤**香 乳香 巴戟內鹽 品補 要虚 精虚 外 破故紙 製者 鹿茸 净 湯 須 去保研並 另 杏 炙酥 炒酒 砂胃

大いしい かう 復原通氣散和 下食前服不飲酒者煎南木香湯調 右為細末每服二錢用熱酒調病在上食後服病在 氣滞疼痛 陰乾入布袋内擦光每服二十九空心温酒薑鹽湯住 下婦人艾醋湯下 船上尚香炒穿山甲各用二两 玄胡索去白牽 炒陳皮去甘草《各南木香不見火 治氣不宣流或成瘡鄉并閃挫腰肠 提治準繩 一兩半 ٠,

金河四周全書 木香流氣飲和 浮四肢植淌口苦咽乾大小便秘 右吹咀每服四錢水一盏半薑三片棗二枚煎七分 不見 勻 煨 芷 丁香皮 草果仁各六木通大两藿香葉 湯浸七次 白术 甘草 二两 火 不見大腹皮製檳榔 - 分陳皮二十 治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虚 一斤 乾木小 青皮去厚朴監製去 二斤 內桂玉 見火蓬我术 人參其石菖蒲 箴皮 麥門冬山木香 紫蘇其香附 赤次本 各 兩 Æ,

踏忽散 和 こううし 熱服 心熱服 連胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛 右為未每服二錢水一盛連根葱白一莖煎七分空 苓 是 青皮去白各半斤縮砂去丁皮 延胡索三肉桂其乾薑丸西蒼术 治男婦脾胃虚冷氣帶不行攻刺心腹痛 滋治準題 模柳西四 三稜牌蓬木根 宿切焙 甘草

動定四月全書 分心氣飲真方益 不通大小便虚秘 右判散每服三錢水一大蓋生薑三片囊二枚燈心 丁 並煎七分不拘時服不知飽以此藥吞温白九初 紫蘇堂第三半夏製枳殼製各一青皮味福紅 檳榔 桑白皮 炒大版皮 藿香兩一甘草二矣半 逢我木根桔梗 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滞噎塞 巻ニナー 木通去赤茯苓 南木香 麥門冬去辣桂 香附

LY COLD LALD 沉香升降散舞 分 塞 水二鍾生薑三片煎一鍾入鹽少許食遠服 氣紫蘇飲 氣促喘急心下脹滿飲食不思 嘔逆不止 紫蘇 盡通 便数次发 大版皮 五味子梗桑白皮多陳皮去桔梗去草果 病顿 1 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞脇疼 則大 治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞 愈 挨考去甘草炙各 證治準絕 **炙各一** 

金月四月五十 木香檳榔九鄉 消食 右為細未每服二錢食前用沸湯調服一方加紅花 木香 沉香 白术 皮白薑黄 神 炒麥裝炒各三稜塊 烏樂 檳 檳榔各二人參 榔 甘草 **陳導三焦 寬利胸膈破痰逐飲快氣** 香附子炒紫蘇葉 放好杏仁 四炒两各 卷二十 大腹皮炒 蓬木 监智仁多二 尖去炒皮 青皮去熟各 訶子爆 厚朴 去是核本皮核 薑製 陳

REDUIL MED 青木香九和 右為細末清水滴為丸如菜豆大每服三十九茶湯 <u> 痰逆不思飲食常服寬中利膈</u> 右為細末別以皂角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更 本香二十檳榔用酸栗米飯裏溫紙包火 黑牽牛山下四十两将骨脂炒草澄加 熟蜜少許和光梧子大每服五十九食後薑湯下 夏麴 皇角去白郁李仁去皮各 治胸膈噎塞氣滞不行腸中水聲嘔還 證治準絕 吗

金月四屋石雪百 沉香化氣丸 氣傷寒大便不通下後遺積未盡感時疫氣瘴氣并 諸惡腫瘡瘍腫毒及食諸般牛畜等物中毒不問婦 逆痞塞胃中積熱中淌腹脹瘧痞茶癖及中諸毒惡 熟水任下 食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五積六聚胸膈氣 男子小兒並皆治之 黄苓係實者人 專治赤白青黄等色痢疾諸般腹痛飲 楝者 白术

王氏博濟利膈九 九巴田馬 八十 小兒六分 右将前四味到碎用雷竹瀝七浸七曝候乾為極細 昏涕唾痰涎精神不爽 末和沉香末再研匀用竹瀝入薑汁少許為九如菜 豆大硃砂為衣晒乾不見火每服一錢淡薑湯送下 沉香山錢另為本 生半熟 皂角 酥炙二两四两半 皂角 不蛀者奎 治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩 強治率 絕 目

在 好也是 台灣 塊氣九 右為末生薑自然汁糊丸如梧子大每服二十九剂 **芥湯臨卧送下** 末 即 积 般 官桂 陳皮去胡椒香 糖毯 豆冠 丁香每半 芫花物 香附子醋京三枝 玄胡索 檳榔 江子各四川工子炒 蓬水炮砂仁 大黄醋雷九 青皮 熟去 蘿蔔子 两半 枳實 川島二強 使君子取白 黑牽牛 用

こうしてここう 右為末酒糊九如梧子大每服五七九諸般病證 隨後項湯使下孕婦不可服忌一切熱物 猪膽蘆薈湯下 **奖湯下** 切血氣當歸酒下 九 薄荷湯下 子江子 心膈膨脹新汲水下 去油沉香 小兒如脾福皮湯下 白痢乾薑湯下 赤痢甘草汤下 做治率 絕 血崩熊子泥湯下 下元冷好酒下 皂角 小兒牌積史君子 小兒驚風一歲 切吐逆生薑湯 醋浸炒去 小兒脱肛 ± 皮 風熱 各

神保九 閉塞大小便不通井花水豆粉調下 當歸酒下 通紅花當歸酒下 疼牽牛湯 下嘅男子小腸氣茴香湯下 沸下 常服者淡薑湯下 治諸氣刺痛流入背齊及脇下諸樂不能治 血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下 傷寒葱白湯下 胎前座後呉茱萸一兩重酒一斤煎至 赤白带下蔓荆子湯下 小女紅脈不通紅花當歸酒 咳嗽鳥梅湯下 婦人經脈丕 血昏

好定四年全書

清咽屑 とうこういまたいたう 者 下 其主方但湯藥入咽即過病所令推廣為屑取其緩 梅核氣仲景所謂咽中如有炙鬱者是也四七湯是 半夏朝一橘红 **食見** 傷 真殭蠶炒風化硝 製自 治喉中如有物路之不出燃之不下俗名 Ī 錢 独治率 绳 川大黄西氨春茯苓 桔 梗 連翹 訶子肉 兰

氣鬱湯 金点四月子言 越鞠九兴解諸勢 為未滴水九如黃豆大每服一百九白湯下 石為末薑汁韭汁和捏成餅晒乾蘇碎如小米粒 每用少許置舌上乾嚥之食後臨卧為佳 香附 錢 鬱 治因求謀不遂或横逆之來或貧害所與或 蒼术米泔浸 卷二十 川芎各二 山梔炒神麴

友巴の車を与 濕鬱湯 湯治之 生薑五片煎 胸 暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆為氣鬱其狀 梔 幾半月母也白茯苓 满肠痛胀沉而濇者是也 香 仁炒各甘草 附重便浸一宿焙乾杵倉木 治因雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧濕地或 如胸肠作痛此有血滞也宜參血鬱 經治準繩 木香 撫芎 檳榔 柴蘇東自行則 **分各** 五 橘 紅 占 用 山

在分口屋台門 遇深淵沉沒幸得馬健無事連濕衣行十五里抵家 虞搏云一男子年二十九三月間房事後騎馬渡溪 次 生薑五片水煎 寒則發脈沉而細緩者是也 汗出衣衫皆為濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜即遇陰 日增寒壯熱肢節煩疼似處非處之狀一醫作虚 白茯苓 蒼木 幾白木 撫芎 杏 附 羌活 橘 獨活 紅 厚朴道汁半夏 錢各 甘草

欠己日日 Aits 察治用四物湯加知檗地骨皮之類及丹溪大補陰 證治而用補氣血藥服之月餘不效又易一醫作勞 用平胃散倍蒼水加半夏茯苓白水川芎香附木通 視六脈皆洪緩重按若牢右手為甚予作濕鬱處治 乳婦人在家止喫人乳汁四五杯不喫米粒名予診 九倍加紫河車服至九月反加滿悶不食乃顧倩有 貼至半夜遍身發紅丹如瘾疹片時隨沒而大汗 仁防風羌活加薑煎服黄昏服一貼二更時又進 遊治準絕 盂

在少日屋 有書 血 一鬱湯 致瘀一應饑飽勞役皆能致血鬱其脈沉澀而乳其 索粥與稀粥二碗由是前病除减能食仍與前方服 體胸脇常有痛如針刺者是也 三貼後以茯苓滲濕湯倍加白水服二十餘貼平安 降真香 香附重便製牡丹皮 凡七情鬱結盛怒叫呼或起居失宜或挫閃 蘇木 山查肉 赤麴 大麥芽 川通草 穿山甲 一妙研各

たこり上いま 热鬱湯 夫非陰虚非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者也 于脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此則治 和匀通口服 水酒各一半煎去滓八桃仁去皮泥七分韭汁半盏 竹葉七片煎 心甘草五鬱金兔小姜皮粮或 連翹與薄荷葉 黄芩五分 山桅仁或麥門冬 有陰虚而得之者有胃虚食冷物抑遏陽氣 問何不用蒼术香附撫芎曰火就縣 经治準絕 夫

動好四月全書 大黄黄連瀉心湯 陽明例 海藏云仲景諸瀉心等湯手少陰也以其心下痞故入 爆藥皆能助火故不用 也 復下之心下痞表裏俱虚陰陽血氣并竭無陽則除 派勢於 疾飲門求之食勢於傷食門求之故不若方 毒復加燒針因胸煩面青黃膚瞤者難治若色微黄 痞 治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因

大足可奉在時 附子寫心湯 右四味切三味以沸湯二升漬之紋去滓內附子汁 利者五苓散主之 心下痞與寫心湯痞不解其人寫而口燥煩小便不 右對如麻豆沸湯二計清之須與欽去率分温再服 手足温者易愈心下痞按之濡其脉關上浮者 大黄 大黄二黄連一兩 加黄芩 黄連 治心下痞而復惡寒汗出本以下之故 黄本每一附子一枚炮去 發治準繩 加黄芩 t 汁皮

生薑瀉心湯 金好中月石雪 伊尹甘草寫心湯 服半斤 硬乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者 分温再服 右八味以水五斤煮取三升去浑再煎取一斤半温 生薑 黄連各半大東学 半夏洗各甘草多黄本 治傷寒汗出解之後胃中不化心下痞 治傷寒中風醫反下之具人下利 人参各一見薑

足已日華在時 服半斤分三 右七味以水五斤煮取三斤去滓再煎取一斤半温 日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔 此非結熱但以胃中虚客氣上逆故便硬宜此湯治 心煩不安醫見心下溶調病不盡復下之其痞益甚 两大囊状 甘草一半夏一黄芩 -證治準 絕 乾薑西半黃連 <u>+</u>

錢氏寫心湯光發 黄茂補中湯 一年出り 一日、日子には 三服 右七味以水一 黄芪 夏鴻心湯 半夏半斤黄本 大東十二 參各二 甘草 一斗煮取六升去浑再煮取三升分温 治下痢而不痛者痞也痛即為结胸 **靴** 人寒各三 黄連一甘草 蒼术 陳皮

大消痞九車 沙足の車 公馬 水 右為細未湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十 至百九食遠白湯下 銭 白术 澤寫 一次陳皮 猪苓五分乾生薑 鍾煎七分温服送下大消痞九 薑黄各一 1 治一切心下痞滿積年久不愈者 者を 参養四澤寫 茯苓各五 設治準繩 黄本馬黄連炒各枳實处炒 神麴炒炙甘草 厚朴 ナ<u>ル</u> 錢各二 三各

失笑九后名 根實消 黄連消痞九東 自りいんとう 寧 懶倦開胃進食 製丸服法同上 錢 在 茯苓 黄連一黄本物二半夏九八實线七 乾生薑二 白木 治心下痞滿壅寒不散煩熱喘促不 治右關脉浮弦心下濕痞惡食 炙甘草各三澤寫 橘紅 薑黄 猪苓

たこうき ニチラ 黄本利膈九東 右為細未湯蒸餅為丸桐子大每服五七十九白湯 利濕消店 補虚之樂也實湯四君子 五苓平胃 枳實 不拘時量虚實加減服 黄連 黄本的一白术 錢炙四 黄連各五白术 澤寫各五 乾生薑 炙甘草 白茯苓 麥蘗 除胸中熱利膈上痰 枳殼 語治準绳 白攀分五 夏寫心湯加减法也內有劉宗摩云以上二方並半 陳皮 人参 南星和三半夏 半夏麴各三 Ē

多方四库全書 草藍九 氣飲子 右為末水浸蒸餅丸每服三五十丸白湯下食遠 右為細未湯浸蒸餅和勻篩子內探如米大每服二 玄明粉二錢加薄荷葉一 **苴宠仁** 柴胡 半夏洗厚朴家石膏 青皮五分 當歸身分白 羌活 獨活巴上各 • 縮砂仁 黄本 治心下痞胸中不利 半酒洗苦夢產 茵蔯酒製 乾葛已上各炙甘 炒酒洗

消痞湯一名木香 東巴田東公島 服忌酒濕麵 右為廳未作一服水二盛生薑三片煎至一蓋食遠 武效方有益智三分無木香 下痞満不思飲食 **錢臨臥用一口湯下** 胡 积實炒當歸梢分 陳皮 分草豆蔻 Ĩ 炙甘草分 治因愛氣鬱結中脫腹皮裏痛心 超沿準绳 各五 半夏鱼紅花 生薑 木香 二 先 Ī

金岁四月有意 理中九 增损理中九寒 三四九 右四味捣篩為末蜜和九如鷄子黄大以沸湯數合 右為細末煉蜜丸如彈子大沸湯化一九 人參 九研碎温服之日三四夜二服腹中未熟益至 治胃寒而痞 白术各一 甘草 治太陰下之智滿鞭 語結 白术 甘草 乾薑三兩各 黄芩 两 枳殻十二 此胸 渴者加

火空四車 在馬 活人桔梗枳殼湯 枳實理中九傷 連進二三服 右爲細未煉蜜九如鷄子黄大每服一九熱湯化下 枯蔞根汗出者加牡蠣 桔梗 茯苓 片 枳殼 Ų 去瓤 治寒實結胸 白术 治傷寒痞氣胸潘欲絕 撥治準鎖 炒 乾薑 甘草西一枳實各 Ī

上清散一名通氣 生がとたんする 以夾衣盖覆面首不語須臾汗出為效未服樂預 右分作二服每服水一蓋半煎至蓋去查臨卧温服 右剉水煎分作二服此手太 判子錢料 膈散行氣 不語服果亦一日不語 黄芪处甘草或人参 葛根五分 防風根 清利頭目寬快胸膈 陰 先 經 用 此藥 湯也 無活 不人 驗書 錢一 緑審

飲來復丹 积术九見傷 死己の東西島 順 木香寬中散 沉透膈湯見反 回 東部見服湯但 金九 發 平胃散見中 槓榔九良傷 署 四君子湯勞 補中益氣湯恩勝大香 **瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪補脾上** 胃 T. 治七情傷於脾胃以致胸膈痞湍停 木香流氣飲 五苓散鬼消越鞠九見過脾湯且塩 煮黄九見心 扭治準絕 小蒂散食 四七湯並見草疾湯 見傷一陳湯 Ŧ

宣明檳榔散 在少口五百十 虚軟 右為末每服二錢薑鹽湯點服屬脾胃虚損之證不 **氣逆或成五膈之病** 可多服當與六君子湯兼服之 豆蔻雨二 檳榔 青皮 香附子 陳皮 枳殼 ~等 治傷寒陰證下後成痞滿而不痛按之 柳 砂仁 木香 兩 甘草 雨炙五 白

PRAJOUR Like 三院搖氣九靈 平補积水九 時刺痛 皮湯送下 右為末神麴糊九梧桐子大每服五六十九食後陳 右為末每服三錢煎黃連湯調下 半夏沙二两檳榔 白豆蔻仁 調中補氣血消痞清熱 治三焦痞滯水飲停積脇下虚滿或 語治華絕 青皮炒京三枝焰桶紅 砂仁 沉香 大腹子 吉 錢各 五 啊

金万四月全書 濟生心姜實九 麻清 族火 無通氣道則病邪日消而脾胃日壮矣參以補 元氣本香以調諸氣為使如此平補氣血米飲下 白陳皮以和 胃枳實消痞黃連清熱為佐 右為未荷葉打米糊為九如桐子大每服六七十 右為末薑汁打糊為九梧子大每服五七十九食後 白术馬白芍酒炒一 小姜實研枳實去 根村梗 人參 木香桑五 治胸膈痞痛微背肠脹喘急妨悶 两半 陳皮 半夏 积實去粮黃連藍 各等 人為

决苓杏仁甘草湯 中景 問喘急矣然疾因火動者加黄連 於薑湯下 長路疾爆 濕桔 梗開 膈載 大巴司奉 在 橘枳生薑湯 右三味以水一斗煮取五升温服一升日三服茯苓三杏仁五十 甘草雨 右三味以水五升煮取二升分温再服 福皮一枳實西生薑中 該治准絕 載樂可謂善治痞 Ī

金好四屋有電 枯婁薤白白酒湯 厚朴大黄湯 意改仁附子散 右二味杵為散服方寸七日三服 右三味以水五升煮取二升分温再服 枯寒為 能白半白酒 厚朴一大黄六枳實四枚 意治仁西 大附子地

たこり早かき 枳實雖白桂枝湯 枯婁難白半夏湯 樂煮數沸分温三服 右五味以水五升光煮厚朴枳實取二升去潭納諸 右三味同煮取二并分温再服 右四味同煮至四升温服一升日三服 枳實四枝厚朴四雖白年桂枝而枯葉! 枯葉心難白三白酒十半夏半 N. 設治準繩 美 一枚

利膈散 色好四月を言 右四味以水八升煮取三升温服一 **浑不拘時頻頻温服** 吹咀每服五錢用水一大蓋薑三片煎至五分去 白术 半两陳皮去白河黎勒去白术 多七 参盖赤茯苓 治胃痺喘息不通 人参 甘草 前胡两各一 乾薑香三 赴薑地桂心 升日三服 甘草

半夏湯 歌定四車全書 一 呉茱萸散 右對片每服五錢水二蓋生薑三片煎至一盏去滓 食前温服日三服 半夏湯洗切焙 稜 具米黃格炒半夏治赤茯苓去鼈甲去据欄 桂心的一枳般 治育痺心下堅痞急痛很背短氣煩悶自汗出 前胡盛青皮去白 治胸脾咽喉噎塞不能下食 小姜實人雅白 語治準绳 秋 炒 薑汁炙檳榔 切二 ŧ 京三 白术

枳實湯 **苴鬼湯** 分去浑食前温服 分去浑不拘時稍熱服 右㕮咀每服五錢水一大盡薑三片棗三枚煎至五 右吹咀每服三錢水二盖生薑三片鹽少許煎至七 白苴魁 治胃瘅心下堅痞 治胃痺心下堅痞智背拘急心腹不利 皮官桂 两 陳皮去麥藥炒各七 皮去 へ 麗木香 超二十 乾薑地甘草炙各三 參西 京三枝 錢半 煨

半夏湯 にこうころ ころう (書 食前温服 右攻咀每服五錢用水一大盖薑叁片煎五分去津 吹咀每服五錢水二蓋生薑五片東三枚學開煎至 蓋去浑不拘時温服 半夏湯洗柴胡各半赤茯苓去前胡去官桂去 枳實效亦茯苓去前胡丟陳皮去白各木香牛 人参我半甘草矣二 治育痺短氣 佐治津絕 天 簏

枳實散 金分正月全書 熨背散 右捣篩以少酷拌帛裹微火炙令媛以熨背上取窪 乃止忌生冷如常法 右為細末每服二錢温酒調服福皮湯調亦可空心 枳實髮炒 鳥頭 兩 川芎 二两官桂 治智痺心背疼痛氣悶 治骨痛及背痛 細辛 錢半 一两二 附子 去產皮 兩二矣半 卷二十一 羌活 蜀椒 桂心品

透膈湯 てここうし とここ 右作 **意氣吞酸船肋刺痛嘔逆痰涎食食不下** 日午臨卧各一 木香 炙各 炒 半夏治青皮去陳皮去大黃 水 錢 服水二鍾萬三片紅棗一枚煎至一鐘食速服 腫 治脾胃不和中脫氣滯胃膈滿悶噎塞不通 白豈蔻 - 服 经台車節 縮砂仁 檳榔 积散學學 朴硝 芜 甘草

国定四库全書 海藏水氣問 問口肌內之外皮膚之裏首至足一身皆腫者當作 氣主之者具在皮也其在皮故汗而發之 經云諸水身半以下腫者當利小便身半以上當發 何治答曰亦宜汗之也與身半以上同法身半以上 汗經云身半以上天氣主之身半以下地氣主之天 汗之者尺寸之天地也故汗之肌肉之外皮膚之裏 身盡腫者從天而汗之此表裏之浮沉凡治之法 難

を日日年 上島 則當殺出本部即是得生也此箇出字出本部之外 問口仲景云少陰脉緊而沉緊則為痛沉則為水小 陰證當沉故脉出者死也此水附骨以當沉而下出 便則難脉得諸沉當附骨身體腫重水病脉出者死 故也 王叔和云水氣浮大即延生二者不同何也答曰少 宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下以其重亡津液 當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州已下皆 盤泊準絕 ŧ

水氣求責法 金少少人人 陽何以周流於一身養育一體故死也 部分俱在其中矣此陰盛而陽虚也故暴出者死何 故死也經云陰陽俱虚脉出者死與此同意水氣浮 屬厥陰腰腫者屬腎 以然少陰沉知周身無陽也水病滞塞不通脉暴出 大即延生者總而言之也五藏六腑上下表裏及諸 有沉而有力 有沉而無力 有浮而有力 腹上腫者 有浮

於足四車全書 · 图 水氣脉并樂 而無力 肺沉大腸浮 心沉小腸浮 紫苑 桂 大腹皮 黄 梔子 枳實 陳皮 中得之亦有有力無力 茯苓 牽牛 为樂 生薑皮 白木 桑皮 機治準繩 甘遂 芍藥 杏仁 大戟 芫花 木通 木香 手 旋覆花

台ジャノハット 腎沉膀胱浮 脾沉胃浮 肝沉膽浮 澤瀉 耆 白术 川芎 芍藥 甘草 胜礪 や樂 茯苓 石膏 滑石 生薑 赤小豆 細辛 稍苓 白术 卷二十 澤蘭 附子 木通 燈草 棄 **葶** 檳榔 瞿麥 黄

仲景杜礪澤寫散治腰下已 仲 胡亭歷 苦亭歷等大豪 伸景亭歷大豪寫肺湯治常歌奏延 た己の事ない 海藏集仲景水氣例水氣源流並出 高低內外輕重表裹隨經補寫要當謹察肺胃腎三 景积本湯治心下水 經病即瘥也 車前子 防巴 於治華絕

村不利而 医者人或 致或 小便 仲景甘草附子白术桂枝湯 仲景生薑瀉心湯 金少山屋台書 仲景十棗湯 三花神祐九 芫花 十棗湯加 四座 腹中雷鳴 甘遂谷等 似沉重疼痛 則不在枝湯 風濕相以 水氣 不利日日月 為魔不微 水痛利腫 氣小 其便

除濕丹 次已日本 Late 防巴黄芪湯什景 玄青丹 右對每服五錢七生薑四片棗一枚水一蓋半煎取 右已上四味樂極有毒不可輕也 黄連 防己一黄炭一两二 白术七线甘草或半 乳香 烏樂 神祐九加 神祐九加 黄栗 青黛 談治準絕 圭

金少正五 白雪 大腹皮散 以水六升煮麻黄去上沫內諸樂煮取三升分温三服 麻黄云石膏 分去浑温服良人再服腹痛加芍藥一 湯調五苓散治因濕為腫者 大腹皮 加木四两即越婢加木湯 汗 杂白皮 下當腫及身重無他證病者但 两生薑三大東 卷二十 )1] 芎 下重從腰 風水縣 浮為在表又云防 巴黄芪湯 枚 十五 漢防已 痿又 灰見 以压 甘草 伸 法潔古用 黄芪湯 南 羌活

た正日早日 防已茯苓湯 精白皮散 **淖不拘時温服** 右吹咀每服五錢水一大蓋生薑三片煎至六分去 右攻咀每服五錢水一大蓋煎五分去潭不拘時温服 楮白皮 西三 陳皮去白 青皮女大黄炒檳榔 指苓去木通各二紫蘇芝葉 耐 證治準鄉 桂心两名 甘草或半 Ē 两 桑白皮

蒲灰散見 木香丸 金がりたる 水六升煮取二升分温三服 熟今患人和汁吞之以盡為度清晨服藥至午時其 為細末以爛 防已 木香 遂炒全味砂知研各 黄茂 **咨詢蘆子** 飯和分作四十九九麵裹於銀內水煮 桂枝西三茯苓六甘草 炒 乳香各二錢 檀椰二枝 两二 炮 甘

檀榔散 いだ四年 全書 海蛤丸 十九米飲送下早晚各一服 右為細未煉蜜和九如桐子大每服二十九加至三 水便下不計行數水盡自止 櫃 茯苓去桑白皮 海蛤研防巴五分 椰井西男 商陸 7 亭蓝隔纸炒 融治準繩 生薑母一桑白皮中雨 陳皮炒去 郁李仁去皮炒 甘草 畫

麻 甘草麻黄湯 利 作二服每服調檳榔末二錢半服至平明當利如未 右除檳榔外用水二大蓋煎至一大盡去率五更初分 升重覆汗出不 汗再服慎風寒 黄附子湯 水五升先煮麻黄去上沫內甘草煮取三升温服 再服 甘草而麻黄 两四

杏子湯、 美巴田華山馬 浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急無治皮水脏張胎五皮湯却 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虚 水七升先煮麻黄去上沫內貳味煮取貳升半温服 八合日三服 五加皮 麻黄西甘草四附子 七日 草石膏湯 地骨皮 生薑皮 易 熱治準绳 炮 一枚 大腹皮 茯苓皮

五皮散 樂最宜 腫 氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠之間故令腫消也此 右攻咀每服三錢水一蓋煎七分温服無時 大腹皮 小便不利服虚而大此由脾肺虚弱不能運行諸 术磨沉省 寒 詹 治他病愈後或瘧痢後身體面目四肢浮 赤茯苓皮 木香 ₹₽ 占 生薑皮 陳皮 桑自

香蘇散蟹 友已可東 在時 除濕湯見中 疏鑿飲子 食前温服 右為末每服二錢水二蓋生薑三片煎至一盡去滓 不拘時日三服並忌生冷油臉堅硬之物 右為麤末每服五錢水一大盡同煎八分去滓温服 陳皮士白 生濟 四磨湯見桂黄湯無保和九見傷 治水氣腫小便赤濇 防已 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩燥多渴 證治準 絕 木通 紫蘇葉各半 主

實脾飲海 金罗巴尼白書 大小便不利服熱藥不得者 服 右㕮咀每服四錢水一盏薑五片煎七分不拘時温 **火不** 見 澤瀉 厚朴去皮白术 木通 草果仁 商陸 秦光羞茯苓皮 治陰水發腫用此先實脾土 赤小豆炒卷活 白茯苓去乾薑一兩甘草 卷二十 木小株大腹子 檀椰各等 大腹皮 椒目 附子地大 炙半

足巴印奉公告 復元丹 五苓散 脹小便不通兩目下腫 枸時温服 右吹咀每服四錢水一盡薑五片東二投煎七分不 製獨活 附子她一南木香粮茴香炒川 車才香流氣飲見 兩 肉豆蔻 治脾腎俱虚發為水腫四肢虚浮心腹堅 白术炒陳皮去具菜更 人根檳榔 設治準絕 各半 椒 炒 桂心兩各 出 厚朴皮去

黑錫丹見諸逆 蘇子降氣湯見 導帶通經湯蟹 金少世月十二世 右攻咀每服五錢水二熊煎至一蓋去查温服空 浮腫 心食前內經口濕治所勝平以告熱以苦燥之以淡 蘇湯送下 右為細末糊丸如梧桐子大每服五十九不拘時紫 木香 白术 治脾濕有餘及氣不宣通面日手足 桑白皮 陳皮翁 校苓去皮

大きりと からう 時痛飲食減少命予治之脈得弦細而緩先生口年 時年五十有八面目肢體浮腫大便連多腹脹腸鳴 為使也 至元戊寅五月間霖淫積而不止魯齊許平仲先生 辛温除肺中滞氣白术苦甘温能除濕和中以苦燥 寒去肺中水氣水腫腫脹利水道故以為佐木香苦 之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以淡渗之故以 世之陳皮皆温理肺氣去氣滯故以為主奏白皮甘

強治準绳

秃

平本藏之氣盛者其脉獨見輕則病甚過則必死故 行而澀為浮腫大便溏多而腹腫腸鳴皆濕氣勝也 陰雨故大發子曰營運之氣出自中焦中焦者問也 牡時多曾服牽牛大黄樂面目四肢時有浮腫个因 安治胃氣虚弱不能運動滋養五蔵則五蔵脈不 四時五藏皆以胃氣為本五藏有胃氣則和平而身 胃氣弱不能布散水穀之氣榮養藏腑經絡皮毛氣 經口真藏之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至

金好四月全書

**木小九见中** 大江日 1.1.17 分氣香蘇飲 其為終身之害也遂用平胃散加白术状岑草豆葱 於甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快不知 體浮腫以導滯通經湯主之良愈 仁數服而服脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢 蘇-義 桔梗 桑白皮 炒陳皮 謹治準經 茯苓 大腹皮 草果仁分五味子 香附炒各

消導寬中湯 多分四月全書 胃苓湯 水二鐘邁三片煎八分入鹽少許食前服 水二鐘薑三片煎八分服澤潤指苓 山查肉 指苓多 白术五分松實故厚朴重陳皮 蒼木 厚朴 7 神妙以参芽 甘草六宫桂五 1 陳皮 炒蘿蔔子一 白术 <u>)</u>0 茯苓每十 炒 銭 茯苓

消風敗毒散 加味五皮湯 Cally at Like 升麻和氣散 水二鐘薑三片煎八分食透服 不服水土八胃苓湯 右水加生薑煎服 人参 川芎 獨活 即五皮散內脚腫加五加皮木瓜防已 前胡 柴胡 謹治 準绳 甘草 桔梗 荆芥 枳殼數羌活 防風錢 里 祑

銀刀四月全書 魚即 補中益氣湯 加减金匮腎氣九 每服四錢水一蓋薑三片燈心十並煎七分食前温服 肚 九 腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蟲證其效 見目 ボ 乾薑雞乾葛 **| 陰腎** 熟半夏 見勞 白芷 六味九見虚 人黄 治肺腎虚腰重脚腫小便不 茯苓各二 蒸半 錢 陳皮 熟枳殼 人参平肺散鬼滋陰九 逸 桔梗 甘草 兩半 各 當歸 熟 利 蒼 尪

欠1とり をはます 調胃白水澤瀉散元 右為未和地黄煉蜜九如桐子大每服七八十九空 心白湯下此薛新南 者非此樂不能致 神此證多因脾胃虚弱治失其宜元氣復傷而變證 杆酒 白茯苓三附子我川牛膝 膏拌 山茱萸 T. 山藥 盤治準絕 重定者 子為君 治疾病化為水氣傳為水鼓不 牡丹皮西一 官桂 熟地黄四 澤瀉 里 車前 指碎 兩

漢防已煮散 金グロノスショーで 附才 正散見施子政湯見虚 能食 下痞者加枳實下盛者加牽牛 右為未一法加白术本樂各半治臍腹上腫如神 白术 杏 檀椰各等 澤瀉 主水腫上氣方 芍樂 卷二十 陳皮 秘褚 之澄 茯苓 生薑

次記事在書 · **夢歷九** 取八合頓服日二小便利為度 右十二味梅篩為散以水一升七合內四方寸七煮 在通草西 漢防已 甜亭歷明 具母與黃木通各一杏仁去皮头防 各二 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便亦色 茯苓 澤漆業 橘皮 **挫治準絕** 白术西生薑加十郁李仁 石章去桑白皮 里 澤寫

白术木香散 分氣補心湯 右作 卧 白皮煎湯食前送下 右為細木用囊內和九如梧桐子大每服五十九奏 白术 甘草各一官桂分滑石或陳皮二 小便秘者宜服 服水二鐘生薑三片煎一鐘食前服 格苓去檳榔 治喘嗽腫湍變成水病者不能食不能 治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急 赤茯苓 澤寫各一木香

調柴飲 をから日上したよう !! 名血分 服 右作一服水二鐘薑三片紅棗二枚煎至一鐘食前 細平 积般好甘草各一香附去之白茯苓 木通 治來血留帶血化為水四肢浮腫皮肉赤紋 木香含五 川芎 川芎 當歸 前胡女腹皮治青皮 證治準絕 延胡索 白芷 桔梗名 0+8 檳榔 白术

當歸散 金为四月五十二 能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脉閉塞渗透 右作 經絡發為浮腫之證心腹堅脹喘満不安 陳皮 夢歷州瞿麥各一 當歸 炙 五 各 分 服煎服法同前 水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火不 赤芍藥 桂 ال 木香 大黄 桑白皮炒大腹皮 卷二十 赤茯苓 銭 細辛 木通 官桂 赤茯苓 檳榔 甘

大小司庫 1.大方 烏鯉魚湯 候 時服 右用水三碗同煮不可入鹽先與魚後服樂不拘時 右作一服水二鐘紫蘇五葉木小一片煎一鐘不拘 我意白五 烏鯉魚尾赤水豆 赤芍藥 治水氣四肢浮腫 陳皮 選治準繩 牡丹皮 桑白皮 白术各一 白术 -錢 陳皮巴 四五

生好四月 全書 無碍九 木香分氣湯 脹虚氣上衝小便臭 右為細末用炒麥蘗麫煮糊為九如梧子大每服七 木香西半 大腹皮工檳榔 木香 十九食前生薑湯送下 治脾病洪流四肢浮腫 稍苓 F 治氣留滞四肢腹急中滿胸膈肠肋膨 澤瀉 郁李仁 赤茯苓 逢木 半夏 三棱 枳殼

次ピコ年 上 防己散 導水茯苓湯 温服 右吹咀每服五錢水一大盡煎至五分去潭不拘時 右對散每服一兩水二蓋煎入麝香末少許同 漢防已 甘草 檳榔 炙半 治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習習然動 燈心草 W 桑白皮 治水腫頭面手足編身腫如爛小之狀 證治準絕 蘇子各等 黄芪 桂心每一赤次苓二 早六

即 酒 漸添多直至小便變清白色為愈 不得若林而睡飲食不下小便秘澀獨出如割而絕 手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側 紫蘇 赤次苓 相似約水一斗止取樂一蓋服後小水必行時即 愈亦當驗其病重之人煎此樂時要如熬阿刺吉 雖有而如黑豆汁者服喘嗽氣逆諸藥不效用此 櫃 榔 麥門冬去澤寫 卷二十 大腹皮 白术百三桑白皮 両 陳皮 砂仁

次正日東人上生 沉香琥珀 進此三服自然利小水一日添加一日 再下小銚內煎至一大蓋五更空心服潭再煎服連 去浑空心服如病重者可用樂五兩再加去心麥門 冬二两燈草半两以水一斗於砂鍋內熬至一大碗 右攻咀每服半两水二蓋燈草二十五根煎至八分 琥珀 木香谷七 丸 杏仁去皮紫蘇 治水腫一切急難證小便不通 強治準絕 赤茯苓 澤寫各半 出土

人参木香散 金万世屋 减 右為細末每服五錢生薑三片水一蓋煎至七分不 右為細未煉蜜為九如梧子大以麝香為衣每服二 十五丸加至五十丸空心人參煎湯送下量虚實加 枳殼 歷 炒 人が一つ 郁李仁去沉香西半 木香 檳榔 治水氣病 猪苓 茯苓 甘草各等 滑石 陳皮去防己各 琥珀 海金砂 錢半 Ł

大沉香尊重丸 文巴司臣 公司 病 **嘰喘乏小便赤澀大便不調一切中満下虚危因之** 拘時温服日進三服 香料 我白牽牛 青皮 金砂 沉香 丝线 丁香 雜當子 敬梢 毒木香 治蟲脹腹滿水腫遍身腫満氣逆嘔 人参 炒 滑石錢郁李仁去皮一兩 潜台車绳 积實以本通多四胡椒 茯苓 車前子 內豆寇各二 夢歷 檳榔 白

續隨子九 金少口屋台電 右為細末生薑自然汁煮糊為九如梧子大每服二 右為末棄內丸如梧子大每服二十九至三十九煎 只可食白粥 桑白皮湯送下食前 十九不拘時薑湯送下日進三服忌鹽魚菓肉麵食 金砂各五錢隨子一夢麼 参 木香 研 治通身腫満喘悶不快 漢防已 赤茯苓麵大檳榔 四两 炒 海

_		 	 		
文已日日 A.A.	-	(100)	301125		
<b>100</b>					
證治準維					
罕九					

證治準繩卷二十一					多万世居人
を二十					
_	·				卷二十一